



Riesgo de Conducta Suicida en Población Penitenciaria Española: un Estudio desde la Perspectiva del Análisis de Redes

Andrés Pemau¹, Anna Pedrola-Pons^{2*}, Alejandro de la Torre-Luque^{2,3}, Gemma Escuder-Romeva^{3,4,5}, Ellen Vorstenbosch^{3,6}

1 Introducción

El riesgo de suicidio en Centros Penitenciarios es significativamente mayor al de la población general,¹ con una elevada interacción de factores de riesgo². Estudiar la conducta suicida desde la perspectiva de redes, favorece una concepción multicausal³. A pesar de su utilidad, esta perspectiva no se ha aplicado aún en prisiones. Este estudio pretende analizar las redes sintomáticas relativas a suicidio entre personas privadas de libertad en España.

2 Método

El estudio parte de datos del Grupo PreCA entre 2007 y 2008, con una muestra de 707 hombres encarcelados en 5 prisiones españolas⁴. El riesgo de suicidio se evaluó con la escala de Plutchik⁵. Se realizaron análisis descriptivos sobre variables demográficas y penitenciarias y se estimó una red sintomática, tomando como nodos los ítems de la escala. La red se estimó usando el modelo Ising para variables dicotómicas. Se calcularon distintos índices de centralidad para cada nodo, así como índices de estabilidad para la red⁶.

3 Resultados

La media de edad de los participantes fue de 36,86 años (DT=9,87). El 73% tenía nacionalidad española. Un 26% había cursado estudios secundarios y un 31% mantenía una relación afectiva. Atendiendo a variables penitenciarias, el 62% había cometido delitos violentos. El 34% reportaba ideación suicida y el 21% intentos de suicidio. La puntuación media de la escala Plutchik fue de 4,12 (DT = 3,27). La red resultó estable y los nodos con mayor centralidad fueron “pensamientos suicidas”, “pesimismo”, “intentos de suicidio” y “dificultades para dormir”.

4 Conclusiones

La ideación suicida es el aspecto más interconectado y relevante con relación al riesgo de suicidio en el contexto penitenciario. Su evaluación e intervención se plantea como una necesidad prioritaria.





Figura 1. La red muestra las relaciones entre los ítems de la escala de Plutchik (reflejados como nodos en la figura). Los vectores azules indican relaciones entre nodos, siendo mayor la intensidad de la relación cuanto mayor el grosor del vector. La gráfica de la izquierda presenta de forma ordenada los nodos más relevantes en la red.

1 Facultad de Psicología y Ciencias de la Salud, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Spain; 2 Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología, Universidad Complutense de Madrid, Spain; 3 Center for Biomedical Research in Mental Health (CIBERSAM), Carlos III Health Institute, Spain; 4 Etiopathogenesis and Treatment of Severe Mental Disorders (MERITT), Sant Joan de Déu Research Institute, Sant Joan de Déu Foundation, Barcelona, Spain; 5 Intensive Psychiatric Hospitalization and Rehabilitation Unit. Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi del Llobregat, Catalonia, Spain; 6 Research, Teaching and Innovation Unit, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat, Spain.

*contacto: apedrola@ucm.es (las referencias están a disposición tras solicitarlas a la autora de correspondencia)

